

Clé textuelle des feuillus

Feuille composée

Feuille alterne

- ❖ 5 folioles » **Caryer ovale**
- ❖ 7 folioles » **Caryer cordiforme**
- ❖ 11 folioles et plus
 - ◆ Noix dans un brou ne s'ouvrant pas
 - Fruit ovoïde » **Noyer cendré**
 - Fruit sphérique » **Noyer noir**
 - ◆ Petits fruits orangés glabres » **Sorbiers**
 - ◆ Petits fruits rouges fortement pubescents » **Sumac vinaigrier**

Feuille opposée

- ❖ Folioles irréguliers, fruit : disamare » **Érable à Giguère**
- ❖ Folioles pennées
 - ◆ Fruit, baie rouge, arbuste » **Sureaux**
 - ◆ Fruit, samare linéaire, arbre
 - Folioles (généralement 7) pétiolulés
 - Rameaux et base des pétioles glabres » **Frêne blanc**
 - Rameaux et base des pétioles pubescents » **Frêne rouge**
 - Folioles (généralement 9 à 11) sessiles » **Frêne noir**



Feuille simple

Feuille alterne

- ❖ Rameau muni de longues épines » **Aubépines**
- ❖ Rameau ne portant pas d'épines
 - ◆ **Feuille doublement dentée**
 - Limbe asymétrique à la base
 - Feuille acuminée au sommet » **Micocoulier occidental**
 - Feuille ovée-oblongue
 - Feuille lustrée, presque glabre » **Orme d'Amérique**
 - Feuille rude, très pubescente » **Orme rouge**
 - Limbe symétrique à la base
 - Écorce ne s'exfoliant pas en feuillets papyracés
 - Écorce blanche avec taches triangulaires noires sous les branches » **Bouleau gris**
 - Écorce gris brunâtre, divisée en courtes lanières verticales » **Ostryer de Virginie**
 - Écorce grisâtre lisse et tronc ondulé » **Charme de Caroline**
 - Écorce rougeâtre
 - ◆ Feuille à nervures proéminentes sur la face inférieure » **Aulnes**
 - ◆ Feuille sans nervures proéminentes sur la face inférieure » **Noisetier à long bec**
 - Écorce s'exfoliant en feuillets papyracés
 - Écorce blanche s'exfoliant en grands feuillets » **Bouleau à papier**
 - Écorce dorée s'exfoliant en petites bandelettes enroulées » **Bouleau jaune**
 - ◆ **Feuille palmatilobée » Peuplier blanc**
 - ◆ **Feuille pinnatilobée**
 - Lobes aigus » **Chêne rouge**
 - Lobes arrondis
 - Dessous des feuilles glabre » **Chêne blanc**
 - Dessous des feuilles pubescent
 - Sinus inférieurs peu profonds » **Chêne bicolore**
 - Sinus inférieurs profonds » **Chêne à gros fruits**

♦ **Feuille simplement dentée ou crénelée**

- Base du limbe clairement asymétrique » **Tilleul d'Amérique**
- Base du limbe symétrique
 - Feuille crénelée
 - Feuille arrondie » **Peuplier faux-tremble**
 - Feuille deltoïde » **Peuplier deltoïde**
 - Feuille ovale acuminée à petites dents serrées, dessous taché de roux » **Peuplier baumier**
 - Feuille ovale à grandes dents espacées » **Peuplier à grandes dents**
 - Feuille finement dentée
 - Bourgeon à plusieurs écailles
 - ♦ Baie pourpre à violet foncé » **Amélanchiers**
 - ♦ Drupe rouge
 - * Feuille lancéolée
 - ∴ Inflorescence en faisceau » **Cerisier de Pennsylvanie**
 - ∴ Inflorescence en grappe » **Cerisier tardif**
 - * Feuille ovale » **Cerisier de Virginie**
 - Bourgeon à une seule écaille » **Saule**
 - Feuille grossièrement dentée » **Hêtre à grandes feuilles**

Feuille opposée

❖ Feuille dentée » **Nerpruns**

❖ Feuille entière » **Lilas commun**

❖ Feuille palmatilobée

♦ **Feuille à sinus aigus**

- Lobes séparés par des sinus peu profonds
 - 3 lobes » **Érable de Pennsylvanie**
 - 5 lobes
 - Lobe terminal carré » **Érable rouge**
 - Lobe terminal triangulaire » **Érable à épis**
- Lobes séparés par des sinus profonds » **Érable argenté**

♦ **Feuille à sinus arrondis**

- Feuille glabre
 - Samares presque parallèles » **Érable à sucre**
 - Samares très divergentes » **Érable de Norvège**
- Feuille pubescente sur la face inférieure » **Érable noir**